

Desalgine[®] C

Ogranicza rozwój alg w basenach.

Nisko pieniący skoncentrowany produkt w płynie.



Desalgine[®] C jest niepieniącym produktem ograniczającym rozwój alg i zalecanym do

Działa skutecznie minimum przez 72 godziny.

Posiada dodatkowo właściwości klarowania wody (usuwa zmętnienie).

Desalgine[®] C ma postać niebieskiej cieczy o charakterystycznym zapachu i zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkildimetylowe, chlorki 95 g/kg.

Desalgine[®] jest ekonomiczny w użyciu dzięki optymalnym dawkom. Posiada obojętne pH, nie zawiera chloru i metali ciężkich. Nie stwierdzono działania uczulającego.

Sposób użycia

Pierwsze dozowanie po napełnieniu basenu – od 1 l do 2 l produktu na 100 m³ wody w basenie.

Dozowanie cotygodniowe – raz w tygodniu dozować 0,3 l (basen kryty) lub 0,5 l (basen otwarty) produktu na 100 m³ wody w basenie.

Przy dużej ilości osób korzystających z kąpeli, po burzach, w czasie wysokich temperatur powietrza oraz po pojawieniu się śliskich osadów w basenie zalecane jest zwiększenie dawki, nie przekraczając podwojenia normalnej dawki, lub częstotliwości dozowania produktu.

Przed dozowaniem sprawdzić odczyn pH wody i w razie potrzeby skorygować do optymalnej wartości pH = 7,0 - 7,4.

Okres wyłączenia obiektu lub terenu z użytkowania:

Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowaniu preparatu.

Wielkość opakowania

Kanister 30 l

Zagrożenia (H; P)

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska

P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu

P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczości: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Ważne wskazówki producenta

W celu uzyskania najlepszych rezultatów produkt **Desalgine® C** dozować поблизу dysz dopływowych. Nie rozcieńczać produktu.

Dozowanie powinno być regularne i w wymaganej ilości.

Nie stosować produktu w zarybionych zbiornikach.

Po pojawieniu się większej ilości glonów (zazielenie wody, śliskie osady, które nie ustępują po użyciu zwiększonych dawek Desalgine **C**) – dozować od 3 do 5 l produktu na 100 m³ wody w basenie oraz przechlorować szokowo basen, używając produktów BAYROL - 100 tabletek **Chloriklar** (lub 2000 g granulatu **Chlorifix**) na 100 m³ wody, najlepiej po uprzednim rozpuszczeniu w plastikowym wiadrze. Przed dozowaniem produktów do dezynfekcji sprawdzić odczyn pH wody i w razie potrzeby skorygować do optymalnej wartości pH = 7,0 - 7,4. Z basenu można korzystać po wykonaniu prób na zawartość wolnego chloru wodzie. Szczegółowe informacje w ulotce produktów do dezynfekcji wody basenowej.

Niecka basenu – ściany i dno basenu spryskać roztworem 200 ml preparatu na 10 l wody i pozostawić do wyschnięcia.

Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: baseny@funam.pl , strona www: www.maytronics.pl